




① 中華野海棠  
② 野海棠之異型小蕊  
③ 野海棠示萼之四枝



③



②

小，白色而有紫點，山野間則絕大多數為正種之紅花杜鵑，偶或發現一兩株紫白紋杜鵑（鹿頭近漆木橋有野生），而紫鐘杜鵑則只見於花園之栽培。

落葉或半落葉性灌木，多分枝，細而直，有褐色粗糙之伏毛。葉互生，橢圓狀卵形，先端與突，基部微楔形，紙質，上面有疏粗伏毛，背面較密，花期三月，2—6朵簇生枝頂，花萼五深裂，有粗伏毛和睫毛，花冠鮮紅色，五深裂，內面有深紅色斑點，小蕊十枚，花絲中部以下有微毛，子房密被粗伏毛，十室，花柱禿淨，蒴果卵圓形，有密粗毛。

四、鶴頂蘭 *Rhauss grandiflora*

本種為香港野生較普通之大型蘭花，且分殖甚易，故園圃中栽植亦多。在郊外各山嶺間之濕地或林下，均有生長。

莖短簇生，基部常膨大成球狀或卵形。葉4—6片，叢生鱗莖上，闊披針形，長達60厘米，先端短尖，基部狹成一長柄狀。花期三月，花軸長達90厘米，花數12—18，排列成一總狀花序，集中於花軸上部。花大型，直徑達7—10厘米，外面白色，內黃褐色，萼片和花瓣矩狀闊披針形，長4—5厘米，短尖，平行脈明顯，唇瓣闊倒卵形，向上包旋，外面先端和基部淡紫白色，裏面深紫。

本種極易栽培，但山嶺之蘭花不能採摘，否則有被控告違法之虞，若在園圃中購買一盆，二三年間，可分殖數盆了。又開花後，則須自行分生，至翌年始有開花，而本株之鱗莖，則不再生花，只有行分殖工作而已。（待續）

吊鐘花及其新葉  
杜鵑花  
鶴頂蘭



。香港市政局刊印之植物名目錄未有紀錄。本人初發現時，解剖其花的構造，與野牡丹屬於 *Melastoma* 者無異，但野牡丹屬之枝葉有毛，萼筒圓形，而本種則全株無毛，萼筒有四明顯的稜，則與花稜，則與花萼裂片同數，故初擬為一種高地之野牡丹屬之新種植物，但近閱「中國高等植物圖鑑」第二冊一〇〇六頁本種之記載，其特徵與採集者大致相同，故採用本品種名，是否確切，仍待專家鑑定。

灌木，高達二米，生當陽地方者高僅約一米。全株無毛，嫩枝方形，帶紫褐色。葉對生，葉柄長約一厘米，近葉基處帶紫褐色，葉形橢圓，全緣，或間有小齒，主脈三條明顯，細脈隱約可辨，葉長2—5厘米，幅2—3厘米。花期早春，稍後於吊鐘。聚繖花序頂生，有花3—10朵，萼筒近鐘形，先端四裂，有四明顯的稜，間有五裂，則為五稜，萼淡暗紅色，花冠四瓣，間有五瓣，與萼裂片同數，粉紅色，生林邊者較淡，當陽者較深，花瓣闊卵形，長達2厘米，幅亦達1厘米（中國高等植物圖鑑之記載，花瓣較本地者為小），小蕊八枚，四枚較長，四枚較短，近花藥頂端單孔裂開，藥基部有短距。

三、杜鵑、映山紅 *Rhododendron Simsii* 杜鵑花科

現在正值杜鵑盛開的季節，無論花園裏，山野，都可見它們爭妍鬥麗，耀炫它的美色，為春色增加了不少情調。正種的杜鵑是鮮紅色，故有映山紅的別名，但其變種則有紫白紋杜鵑（花有白色和紫色條紋）和紫點杜鵑（花較