

# 五月

的

漁父



七爪龍

## (五)鳳眼藍、布袋蓮(台灣) (*Eichornia crassipes*)雨久花科

生沼澤之浮水植物，葉直立，葉柄中部膨大成囊狀，用以浮生水面。葉片卵形或圓形，青綠滑澤。鬚根甚多，有根毛狀小分根，下垂水中或達泥面，呈黑褐色。花期6—10月，穗狀花序單生，長達15—30厘米，有花十數朵。花被6枚，長達5厘米，青紫色，下面5枚大小約相等，上面1枚較大，藍色而有黃色斑點，甚美觀。小蕊6枚3長3短。

本植物在珠江三角洲，及新界各地之淺水泥沼或池塘均有生長，隨水漂流，繁殖迅速。在美國佛羅里達州之沼澤及河流繁殖尤多，阻塞河道，極為不便，但對清除水中污穢廢物，甚為有效，而美洲鱷亦極喜食之。廣東各地及新界之鄉民，亦有採之用火燒至糜爛，雜於飼料以供豬食，則長肉甚快云。

## (六)五爪金龍(*Ipomoea cairica*) 旋花科

多年生纏繞藤本，莖常有小瘤突起，全株無毛，葉五指深裂，幾達基部，有如相傳之龍爪，故以名之。花期夏秋，花序發生於葉腋間，有花1—3朵，萼綠色，花冠淡紫，漏斗狀，長約5—6厘米，斗口直徑達5厘米。

本種在郊區各地均有繁生，尤以低濕地為甚，茂密成蓬叢，或附繞於灌木上而成蓋狀。

鳳眼藍



一般不知其名，或稱之為牽牛花、喇叭花等名稱。實則牽牛為一年生藤本，全體有毛，莖上無瘤狀突，葉大卵形，有淺三裂，花期秋季，多單生，花冠黃白色，至淺藍色。其學名為(*Ipomoea hederae*)。

(七)七爪龍(*Ipomoea digitata*)

小灌木，高達2米，枝黑褐色。葉對生，薄革質，長倒卵形，長達6—13厘米，先端鈍短尖，基部楔形，具短柄，全緣。花期五六月。

多年生，禿淨大藤本，莖甚粗壯，稍帶紫褐色。葉大，圓至腎形，寬7—15厘米，指狀5—7深裂。花期夏秋，花序腋生，有花3—5朵，花冠粉紅或紅紫，闊漏斗狀。本種可供觀賞，但極少栽植，而野生者亦不常見，僅十四鄉一帶有野生。

上接第三十九頁「馬鞍山」

不盡，水天無涯之感。

北峯——馬鞍北峯環望所見，又為另一番景象，此方觀眺，略可分為山水兩半，大致北景為海，南景為山，北景中沙田海、大埔海、船灣及赤門海峽四處連成一片，水域直透大鵬灣，四海中沙田海半遭填塞，大埔海北岸亦多填海工程，兩處之天然景色，已被破壞無遺，船灣海東半雖有大壩攔截成湖，其景色無大變易，仍有可觀，赤門海峽全區幸免於難，依然舊貌，海中三小礁嶼散立水道之上，體小而微，須小心細覓始可得見，四海水域之後，羣山環立，然海景佔盡風光，南景以聳立馬鞍低坳之上之馬頭頂高峯為主，山勢右行而過，折為彎曲山與大金鐘，與對谷之女婆水牛山脈，互作呼應，水牛以外，左有大上托及大孤羣山，右為一字橫列之九龍諸嶺，馬鞍主峯左畔下首近有黃竹洋羣山及木棉山，次為鵝公頭，鐵矢山及大王爺墩，遠處則有人枕蓋、牌額及南蛇尖石屋諸山，層層重疊，起伏有緻，凡西貢島上全部山巒，盡在望內，此方景色，除西貢海東畔及企嶺下海部份與遠在天邊之東海及南海略有水光波影外，一望盡為山景。

馬鞍山山高路險，一般而言，登遊宜擇秋冬之候，春天時有濃霧，夏日天氣炎熱，均不甚適宜，惟春夏之間山上多異種杜鵑，花盛時極堪細賞，盛夏登高，馬鞍頂上視野無遠不屆，山頭揮汗喘氣之餘，游目四顧，指認河山，實為千金不易之極大樂趣，故時見有嗜山若狂之任冒暑登山，看花賞景，旁人目以為癡，彼則自得其樂。